

Com estudiar els casos de paràlisi flàccida aguda (PFA)

L'OMS⁽¹⁾ coordina l'Estratègia mundial d'erradicació de la poliomielitis. L'últim cas de poliomielitis endèmica a l'Estat espanyol es va notificar el 1988. Malgrat els esforços, la poliomielitis encara no s'ha erradicat del món: existeix risc real d'importació de la malaltia a tots els països.

A Catalunya es vigilen els casos de paràlisi flàccida aguda (PFA)^{(2),(3),(4)} en menors de 15 anys.

PODRIA SER POLIOMIELITIS

independentment del diagnòstic clínic inicial (SGB, mielitis...)

Inici de la paràlisi



Notificar a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) segons el circuit establert en el Protocol⁽³⁾

+

Completar l'enquesta epidemiològica⁽³⁾

+

Fer estudi microbiològic de les femtes per descartar poliovirus

Prendre mostres dins dels 14 dies de l'inici de la paràlisi

Femtes 1



Almenys 24 hores

Femtes 2



Enviar-les al Laboratori de referència: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Fer cultiu cel·lular



(3)



epidemiologia@gencat.cat

(1) Estratègia mundial d'erradicació de la poliomielitis

(2) Plan de Acción en España para la Erradicación de la Poliomielitis

(3) Protocol per a la vigilància de les paràlisis flàccides agudes en menors de 15 anys a Catalunya: pla d'erradicació de la poliomielitis

(4) Protocolo de Vigilancia de la Poliomielitis en España