

# Principals símptomes del xarampió

**Recull d'imatges que poden ajudar en el diagnòstic precoç del xarampió**

30 d'abril de 2024

**Autors:**

Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

**Alguns drets reservats**

© 2024, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina [web de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

**Unitat promotora:**

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. ASPCAT

**1a edició:**

Barcelona, abril de 2024.

**Assessorament editorial:**

Gabinet del Conseller. Serveis editorials.

**Assessorament lingüístic:**

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut.

**Fotografia:**

© Fotografies estretes del repositori públic del Public Health Image Library (PHIL) del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) <https://phil.cdc.gov/default.aspx>

Disseny de plantilla accessible 1.08.

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

## Sumari

|   |                                                       |   |
|---|-------------------------------------------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓ .....                                     | 4 |
| 2 | RINORREA, LLAGRIMEIG I FEBRE ELEVADA.....             | 5 |
| 3 | CONJUNTIVITIS .....                                   | 5 |
| 4 | RASH CUTANI GENERALITZAT (A VEGADES MES DE 40°C)..... | 6 |

## 1 INTRODUCCIÓ

### ELS SIMPTOMES DEL XARAMPIÓ

El xarampió és una malaltia viral molt contagiosa que afecta sobretot els infants i pot causar greus problemes de salut, especialment per als nadons.

Tot i ser molt transmissible, és fàcilment prevenible mitjançant [la vacunació](#). Per tant, és de gran importància continuar mantenint unes bones cobertures de vacunació del xarampió en la població, administrant les dues dosis corresponents de la vacuna triple vírica (xarampió-rubèola-galteres) als **12 mesos i als 3 anys**, segons el calendari vacunal vigent. Així mateix, és important que **els infants o adults que no han passat la malaltia o que no han estat vacunats, rebin dues dosis de vacuna separades amb un interval mínim de 4 setmanes**.

No obstant això, i donada la situació epidemiològica en països del nostre entorn on estan creixent el nombre de casos de xarampió, existeix un risc que a Catalunya arribin casos importats.

Es important, [reconèixer els principals símptomes de la malaltia](#) i, davant d'una sospita de malaltia clínicament compatible amb xarampió, recomanar **l'ús de mascareta** tant al pacient (quirúrgica) com al professionals que l'atendran (FFP2), procedir al seu **aïllament respiratori** el més aviat possible per evitar el contagi al seu entorn i **notificar-ho de manera urgent (abans de 24 hores)** al [servei de vigilància epidemiològica](#) corresponent a l'àmbit territorial o al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) fora de l'horari laboral, amb la finalitat d'iniciar les actuacions de control de manera immediata i la coordinació de les proves diagnòstiques.

Aquest document recull una sèrie d'imatges autoritzades que poden ajudar a permetre el diagnòstic precoç del xarampió.

El xarampió generalment comença amb els símptomes següents:

## **2 RINORREA, LLAGRIMEIG I FEBRE ELEVADA**



## **3 CONJUNTIVITIS**





De **tres a cinc dies després** que comencen els símptomes anteriors, apareix un **rash cutani**. Generalment, aquest comença com a punts vermells i plans a la cara on comença el cabell i s'estén cap al coll, tronc, braços, cames i peus. En aquest moment la febre pot augmentar a més **40°C**.

#### 4 RASH CUTANI GENERALITZAT (A VEGADES MES DE 40°C)

