

TÍTOL: Assaig clínic multicèntric prospectiu aleatoritzat per a comparar l'eficàcia i seguretat del tractament mèdic ambulatori i amb hospitalització domiciliària vs. ingrés hospitalari en pacients amb pancreatitis aguda lleu.

Introducció

La pancreatitis aguda (PA) és una de les causes gastrointestinals més comuns d'ingrés hospitalari. El 70% dels pacients presenten una PA lleu (PAL) i actualment el tractament estàndard implica un ingrés hospitalari. Habitualment els pacients amb PAL aconsegueixen una recuperació completa en menys d'1 setmana i existeixen escales de predicció de gravetat òptimes.

Objectiu

L'objectiu de l'estudi és determinar si en casos de PAL el tractament ambulatori i d'hospitalització domiciliària és similar a l'ingrés hospitalari en termes de tolerància a la dieta, control del dolor, risc de gravetat, complicacions, satisfacció del pacient i costos.

Mètodes

Estudi multicèntric, prospectiu, aleatoritzat. Pacients amb PAL seran aleatoritzats en 3 grups de tractament A: ambulatori: a l'alta d'urgències el pacient serà contactat diàriament per telèfon i una analítica a les 48h; B: hospitalització domiciliària: seran seguits pel servei d'hospitalització domiciliària amb analítica a les 48h; C: ingrés hospitalari. Seguiment en consultes externes a la setmana 1 i mes 3 de l'alta. La variable principal és la taxa de fallada en el tractament ambulatori/hospitalització domiciliària comparat amb els pacients del grup ingrés hospitalari. Les variables secundàries són: recaiguda del dolor; intolerància a la dieta; reingrés hospitalari; dies d'estada; requeriment d'UCI; fallada d'òrgan; complicacions; costos; satisfacció i sensació de seguretat del pacient.

Dades de contacte: Elena Ramírez Maldonado (elena.ramirezmalDONADO@gmail.com) Hospital Universitari Joan XIII.