

INFORMACIÓ SOBRE VACUNES NO FINANÇADES

- Les vacunes han estat un dels més grans avenços científics de la història de la humanitat, i han salvat milions de vides. Els seus efectes secundaris, en cas d'aparèixer, solen ser lleus i transitoris.
- A partir dels dos mesos, el vostre fill/filla rebrà vacunes que li serviran per a prevenir moltes malalties greus que poden ser evitables.
- Les vacunes s'apliquen segons un calendari establert i recomanat pel comitè d'experts del Departament de Salut de la Generalitat. Hi ha **vacunes finançades** pel sistema públic de Salut que tot infant rep de manera gratuïta.
- Hi ha vacunes **també recomanades per les societats científiques que encara no estan finançades** i la seva administració queda a decisió dels pares o tutors que són les següents:
 - **Vacuna tetravalent contra els meningococs A, C, W i Y:** serveix per a evitar malalties produïdes per aquests gèrmens, especialment meningitis i sèpsia. Està finançada als 12 mesos i 11-12 anys, però també és recomanable administrar-la als **4 mesos** (de forma no finançada), perquè el primer any de vida és el de màxim risc de patir la malaltia per aquests microbis.
 - **Vacuna contra el meningococ B:** serveix per a evitar malalties molt greus (sèpsia i meningitis) produïdes per aquest germen - -. Està finançada el primer any de vida. En cas de no haver-la rebut la recomanació és administrar-la a qualsevol edat. Són **3 dosis abans dels 2 anys i 2 dosis a partir dels 2 anys**.
 - **Vacuna contra el rotavirus:** el rotavirus és un microbi que produeix quadres de gastroenteritis greu en lactants petits, especialment a la tardor i a l'hivern, caracteritzades per diarrea important, febre, vòmits i malestar general. És un quadre potencialment greu que pot provocar deshidratació i necessitat d'ingrés a l'hospital. Existeixen dues vacunes que s'administren a **partir dels 2 mesos en 2 o 3 dosis**.
 - **Vacuna contra la tos ferina en adolescents i adults:** la tos ferina és una malaltia que pot afectar a qualsevol edat. Pot ser molt greu (fins i tot mortal) en lactants fins a 6 mesos, que encara no han rebut la protecció completa de 3 dosis de la vacuna. En adolescents i adults la malaltia és lleu, pot passar desapercebuda i no fer-se el diagnòstic. És important revacunar els **adolescents** per tal d'evitar la transmissió als lactants petits, especialment a menors de 6 mesos. És recomanable vacunar els adults que conviuen amb aquests lactants, atès que ja no tenen la protecció de les vacunes que van rebre a la seva infància.
 - **Vacuna contra el virus del papil·loma humà:** serveix per a evitar el càncer de coll d'úter a les noies i d'altres càncers localitzats a les zones genitals, al coll i al cap en ambdós sexes, així com les berrugues genitals. Està finançada a nois i noies d'11-12 anys i s'administra a l'escola a 6è de primària. Si el noi o noia és més gran i no l'ha rebut és recomanable que se li administri preferentment abans que comenci a tenir relacions sexuals. **Si el noi-noia no ha complert 15 anys n'hi ha prou amb dues dosis. Si ja ha fet els 15 anys en són 3.**

Feu-nos saber qualsevol dubte o neguit que tingueu. Des de l'àrea de pediatria us els intentarem esvair.