

# **Estudi europeu sobre l'efecte del sexe i el gènere del pacient en el sostre terapèutic que estableixen els metges i metgesses d'urgències**

**Òscar Miró<sup>1</sup>, Amelie Vromant<sup>2</sup>, Yonathan Freund<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Àrea d'Urgències, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Catalunya, Espanya

<sup>2</sup>Hôpital Pitié-Salpêtrière, Universitat La Sorbona, París, França

European Journal of Emergency Medicine 2024, 31:423–428

Original article

## **Effect of patient gender on the decision of ceiling of care: an European study of emergency physicians' treatment decisions in simulated cases**

Amélie Vromant<sup>a</sup>, Karine Alamé<sup>a,b</sup>, Clémentine Cassard<sup>a</sup>, Ben Bloom<sup>c</sup>, Oscar Miró<sup>d</sup> and Yonathan Freund<sup>a,b</sup>




	<b>N=3433</b> <b>n (%)</b>
<b>Gènere del professional</b>	
Home	1799 (52,6)
Dona	1595 (46,6)
No binari	8 (0,2)
Prefereix no respondre	21 (0,6)
<b>Edat del professional [mediana (RIC)]</b>	
<35 anys	1545 (29,9)
35-50 anys	1025 (45,1)
>50 anys	843 (24,6)
<b>Experiència a urgències</b>	
≤5 anys	1106 (32,2)
>5 anys	2317 (67,8)
<b>Lloc de treball</b>	
Hospital universitari	1909 (55,8)
Hospital no universitari	1479 (43,2)
<b>País on practica la medicina</b>	
França	1532 (44,8)
Sud d'Europa	829 (24,2)
Espanya	494 (14,4)
Centre d'Europa	579 (16,9)
Regne Unit	245 (7,2)
Nord d'Europa	213 (8,44)

**2390 decidiren intubar (70%)**

1310 canvien la decisió d'intubar (55%)

1080 no canvien la decisió d'intubar (45%)

# Decisió d'intubar



**Decisió metge/metgessa intubar a una dona:  
0,82 (0,69-0,93)**

Quan decideix intubar, si un pacient **dona** li expressa  
negativa a ser intubat, canvia de decisió:  
0,80 (0,67-0,95)

