

Incidència de retrombosi en pacients amb trombosi portal no cirròtica no tumoral (TPNCNT) Estudi prospectiu observacional

**Anna Baiges¹, Bogdan Procopet¹, Gilberto Silva-Junior¹, Elba Llop⁴, Anna Darnell³, Fanny Turon¹, Angeles García-Criado³, Jose Luis Calleja⁴, Jaume Bosch¹⁻², Virginia Hernández-Gea¹⁻², Juan Carlos Garcia-Pagán¹⁻²,
grupo REHEVASC**

¹Hemodinàmica Hepàtica, Institut de Malalties Digestives I Metabòliques, Hospital Clínic de Barcelona. Institut de Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). ²Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERhd), España. ³ Centre de Diagnòstic per la Imatge, Hospital Clínic de Barcelona. ⁴Hospital Universitario Puerta del Hierro, Majadahonda.

Incidència de retrombosi en pacients amb trombosi portal no cirròtica no tumoral (TPNCNT)

- **RECOMANACIONS d'ANTICOAGULACIÓ INDEFINIDA TPNCNT (EASL)**

- 1.- Factor protrombòtic (sdr. Mieloproliferativa o factor procoagulant)
- 2.- Antecedents de trombosis prèvies
- 3.- Trombosi que associa isquèmia intestinal

No obstant, les dades sobre l'eficàcia d'aquesta actitud i la incidència de retrombosi en pacients sense ACO són escasses.

Incidència de retrombosi en pacients amb trombosi portal no cirròtica no tumoral (TPNCNT)

- **OBJECTIUS / MÈTODES**


Avaluar la incidència de retrombosi en una cohort prospectiva de 108 pacients amb TPNCNT des de 1998 fins 2015 seguits amb angioTC o angioRM durant una mitjana de 63 mesos (5-180)

- 39 pacients amb factor proagulant
- 35 factor local
- 34 idiopàtica

Incidència de retrombosi en pacients amb trombosi portal no cirròtica no tumoral (TPNCNT)

● RESULTATS


Probabilitat lliure de retrombosi pacients TPNCNT



Pacients en risc

108 102 88 80 64 54 47 40 32 24 21

TPNCNT idiopàtica o factors locals (n=69%)



Pacients en risc

Anticoagulació	12	11	10	8	5	3	2	2	1	1	1
No anticoagulació	57	53	44	43	36	34	29	24	18	14	13

Incidència de retrombosi en pacients amb trombosi portal no cirròtica no tumoral (TPNCNT)

- **CONCLUSIONS**

La re-trombosi en pacients amb TPNCNT idiopàtica o amb factor local no és infreqüent.

Per tant, s'hauria de replantejar l'actitud de no anticoagular indefinidament aquests pacients.

És necessari identificar factors de retrombosi en aquests pacients.