



Girona

Dijous, 10 de març de 2016
Palau de Congressos

37

Reunió
de la Societat Catalana
de Medicina
Intensiva i Crítica



33

Jornades Catalanes
d'Infermeria
Intensiva i Crítica

*Treballant en equip
per una UCI sense fronteres*

HJ23
Hospital Joan XXIII

**Fluidoteràpia en el xoc sèptic, més enllà de
les càrreges de fluids.**

Existeix volum infós ocult?

J. Leache, M. Cartanyà, G. Moreno, P. Perelló, J. Monclou, E. Machado,
C. Villavicencio.

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.



OBJECTIU



Avaluar les característiques de la fluidoteràpia durant la primera setmana d'evolució del xoc sèptic i el seu possible impacte sobre la morbimortalitat dels pacients.



MATERIAL I MÈTODE



Prospectiu observacional.

35 pacients ingressats correlativament amb diagnòstic de xoc sèptic.

Analitzem característiques demogràfiques, commorbiditats, APACHE II, SOFA, SAPSII, paràmetres clínics de fluidoteràpia i hemodinàmics durant 7 dies i la mortalitat als 28 dies.

Definim com a volum ocult aquell que s'administra fora de l'aport en càrregues.

RESULTATS I CONCLUSIONS



Observem un elevat aport de volum ocult relacionat amb la infusió de líquids de manteniment i associat a fàrmacs mantinguts en el temps, tot i la estabilitat hemodinàmica a partir de les 48h d'ingrés.

La ressucitació insuficient en les 6 primeres hores i el balanç hídric acumulat excessiu al 7è dia s'associen a major mortalitat als 28 dies.



MOLTES GRÀCIES