

XXXI JORNADA CATALANA
DE DIAGNÒSTIC
PRENATAL ECOGRÀFIC

TUMOR
OROFACIAL:
MANEIG PERINATAL

Natalia Visa Figueredo

Clara Martínez, Alexandra Bonmatí,
Cristina Adrados, Roser Masó, Anna Borrell,
Carlota Alepuz i Anna Maroto



PRESENTACIÓ DEL CAS



33 anys

TPAL: 0000



20.3 SG

**ECOGRAFIA
CRIBRATGE 2n
TRIMESTRE**



QF-PCR
Array





1 D 14.84mm
2 D 7.21mm

25.5 SG








32.2 SG



34 SG



34 SG






AMNIODRENATGE → 3.700 cc


36.1 SG

RPM + DU regular

Mida 83 x 39 x 45 mm



CESÀRIA EXIT




OBSTETRICIA

NEONATOLOGIA
+
CIRURGIA
PEDIÀTRICA

ANESTESIOLOGIA

NAIXEMENT



Nadó genitals masculins

2.700 gr

Apgar 9-10

pHa 7,16 // pH v 7,34



EVOLUCIÓ

24 h de vida → resecció fragmentada de la massa fins pedicle (nasofaringe)
S'objectiva fissura palatina.

RM control
romanent
tumoral regió
esfenopalatina

ALTA 58 ddv amb
traqueostomia

AP
Teratoma madur

2ª IQ (12 mesos) → Resecció romanent tumoral via endoscòpia nasal

13 mesos → Decanulació

TAKE HOME MESSAGES

DEFINICIÓ

Teratoma que sorgeix de la naso-orofaringe



PREVALENCIA

1 / 35.000 – 200.000



DIAGNÒSTIC

Ecografia i RM fetal



TERATOMA EPIGNATHUS

COMPLICACIONS

- Obstrucció via aèria
- Dificultat alimentació



CONDUCTA OBSTÈTRICA

Cesària EXIT



TRACTAMENT

Ressecció quirúrgica completa





MOLTES GRÀCIES