

Bones pràctiques en seguretat de medicaments

LA VISIÓ DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Amelia Troncoso Mariño

Àrea de Suport al Medicament i Servei de Farmàcia
GAPiC Litoral-Esquerra
GAPiC Muntanya-Dreta
Institut Català de la Salut

Barcelona, 17 de juny de 2025

Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona
Institut Català de la Salut



1.325.208 habitants

Activitat assistencial



5.064
professionals



51
equips
d'atenció
primària

1
equip
d'atenció
primària
penitenciari


10
equips
territorials
d'atenció
pediàtrica



CONSULTES

visites als equips d'atenció primària*

4.480.383	Medicina de família
3.163.304	Infermeria
585.439	Pediatría
168.822	Odontologia
185.648	Treball social




8.583.596
VISITES TOTALS

Envel·liment i multimorbiditat

Un 21,1% de la població de Barcelona ciutat té més de 65 anys

Gràfic 1. Percentatge de població amb 65 anys o més.



Font: Idescat




Figure 1: Number of chronic disorders by age-group


Barnett K, et al. Lancet 2012;380:37-43

"Las dolencias crónicas son más frecuentes con el envejecimiento"

4 de cada 10 personas mayores de 14 años sufre un proceso crónico como artrosis o hipertensión.

Polimedicació

Gràfic 1. Població major de 65 anys de la Gerència Territorial de Barcelona polimedicada.




Conseqüències polimedicació



Segons dades del nostre entorn, un 19,4% de la població major de 65 anys té prescrits ≥ 10 medicaments.

Visión POBLACIONAL



603.035 persones amb prescripció activa
d'algun medicament



Visión INDIVIDUAL



Revisión de la medicación centrada en la persona

La seguretat del pacient des d'una visió POBLACIONAL

2008 Desenvolupament de TIC amb Fons de l'URM





Mòdul de seguretat

1. Mòdul PREFASEG per prevenir PRM
2. Mòdul Self-audit per facilitar la revisió de la medicació



Integració d'eines de suport a la prescripció farmacèutica: PREFASEG

- Valora cada nova prescripció, comprova que és segura i que no comporta riscos per a la salut del pacient. Genera alertes de seguretat, en el moment de la prescripció, per raons prèviament informades a la HCE i proporciona orientació terapèutica.



Integració d'eines de suport a la prescripció farmacèutica: PREFASEG

- PREFASEG aborda les següents dimensions de seguretat:




Interaccions medicamentoses



Contraindicacions per problemes de salut i/o edat i per variable clínica



Fàrmacs desaconsellats en geriatria



Al·lèrgies



Tractaments redundants



Teratogènia en edat fèrtil




Alertes de seguretat de l'AEMPS



Avisos en pediatria



Revisió de durades de tractament




Combinacions de fàrmacs anticolinèrgics

Integració d'eines de suport a la prescripció farmacèutica: SELF-AUDIT

- Facilita a cada professional la revisió sistemàtica de la medicació dels pacients. Dóna suport al professional per gestionar els canvis. Presa de decisions on-time i activació voluntària.
- SELF-AUDIT aborda les següents dimensions de seguretat:




Contraindicacions per problemes de salut i/o edat i per variable clínica



Combinacions de fàrmacs anticolinèrgics



Alertes de seguretat de l'AEMPS



Polimedicació



Fàrmacs desaconsellats en geriatría



Necessitats de gastroprotecció



Revisió de durades de tractament



Medicació evitable



Tractaments redundants

Programes per millorar la seguretat: DESPRESCRIPCIÓ


OBJECTIU:

- Millorar la **seguretat** en l'ús dels medicaments **desmedicalitzant** a la població



***Retirada** planificada,
estandarditzada i individualitzada
de la medicació crònica*

Motius de desprescripció



Programes per millorar la seguretat: DESPRESCRIPCIÓ

La intervenció té impacte sobre el total dels medicaments

Estratègia de desprescripció	DESPRESCRIUEN Medicaments (N)			NO DESPRESCRIUEN Medicaments (N)		
	V0 (basal)	V4	Variació (%)	V0 (basal)	V4	Variació (%)
<i>IBP no criteris de GP</i>	7,4	6,0	-18,9%	7,8	8,0	2,6%
<i>HIP PP en >80 anys</i>	8,0	6,7	-16,3%	7,6	7,9	4,0%
<i>BIFOSFO. més 5 anys</i>	7,5	6,1	-18,7%	7,7	8,0	3,9%
<i>OSTEOPOR <60 anys</i>	4,8	3,9	-18,8%	5,1	5,2	2,0%
<i>ALZHEIMER >2 anys</i>	9,2	5,0	-45,7%	8,7	8,9	2,3%
<i>SYSADOAS</i>	6,1	5,1	-16,4%	6,6	6,7	1,5%

Programes per millorar la seguretat: DESPRESCRIPCIÓ



Pastilles,
només les
necessàries



Generalitat
de Catalunya

“Protectors gàstrics”

Medicaments per tractar o prevenir malalties digestives



Contingut:

[“Protectors gàstrics”: quan són realment necessaris?](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[Què són els antiulcerosos o inhibidors de la bomba de protons?](#) [↗](#)

Infografia per als professionals:

[Inhibidors de la bomba de protons \(IBP\)](#) [↗](#)

Antiespasmòdics urinaris

Medicaments per a la incontinència urinària d'urgència



Contingut:

[Tractament de la incontinència urinària](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[Els antiespasmòdics urinaris: què n'heu de saber?](#) [↗](#)

Infografia per als professionals:

[Antiespasmòdics urinaris: material per a professionals](#) [↗](#)

Hipolipemiants

Medicaments per al colesterol elevat



Contingut:

[Quan cal un medicament per tractar un colesterol elevat?](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[La hipercolesterolèmia](#) [↗](#)

Infografia per als professionals:

[Tractament hipolipemiant en pacients fràgils i polimedicats](#) [↗](#)

Hipoglucemiants no insulínics

Medicaments per a la diabetis mellitus tipus 2



Contingut:

[Tractament de la diabetis mellitus tipus 2](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[La diabetis mellitus tipus 2: què n'heu de saber?](#) [↗](#)

Infografia per als professionals:

[Ús de fàrmacs hipoglucemiants en pacients fràgils polimedicats](#) [↗](#)

Antihipertensius

Medicaments per a la hipertensió arterial



Contingut:

[Tinc la pressió alta \(hipertensió\): com puc controlar-la?](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[La hipertensió arterial: què n'he de saber?](#) [↗](#)

Infografia per als professionals:

[Ús de fàrmacs antihipertensius en pacients fràgils polimedicats](#) [↗](#)

Benzodiazepines

Medicaments per a l'ansietat i l'insomni



Contingut:

[Benzodiazepines: què cal saber-ne per evitar riscos?](#) [↗](#)

Infografia per a la ciutadania:

[Ansietat i insomni: què n'heu de saber?](#) [↗](#)


Infografia per als professionals:

[Ús adequat d'ansiolítics i hipnòtics per a l'ansietat i l'insomni](#) [↗](#)

Programes per millorar la seguretat: DESPRESCRIPCIÓ



Material per professionals i ciutadania



Integració a l'ECAP i monitorització de resultats

Polimedicats ≥ 10 Fràgils Polimedicats +15

Polimedicació + Taula resum

GRUPS SELECCIONATS:

- ☐ Antiulcerosos
- ☐ Antihipertensius
- ☐ Hipolipemiant
- ☐ Antiespasmòdics urinaris
- ☐ Anticòlic
- ☐ Benzodiazepines
- ☒ Antihipertensius

UP: ABS BARCELONA-2A (ST. ANTONI)

UABs:

Desar

CIP	NOI	TELEFON	MF	INF	ED	NIVELL FRAG.	Nº ATC	Nº REV.	A/R	PCC/ MACA	REVISAT
			1	1							
			1	1							

Webinars per professionals



Indicador	Resultat	Numerador	Denominador	Detall
INDPOLIMED - Indicadors Polimedicació				#
MEDPRIOR - Polimedicats prioritzats (≥ 10 ATC i fràgils)				#
MEDBP - Inadequació de la prevenció de la gastropatia en polimedicats fràgils	2,27	1.007	44.332	+
MEDADAB - Control excessiu DM2 en població polimedicada i fràgil	3,80	1.686	44.332	+
MEDSTATINES - Estatines en prevenció primària en polimedicats fràgils	7,81	3.464	44.332	+
MEDURNARIS - Antiespasmòdics urinaris en població polimedicada fràgil	1,36	601	44.332	+
MEDANTICOL - Tres o més medicaments amb efectes anticolinèrgics en població polimedicada fràgil	3,57	1.581	44.332	+
MEDBENZOS - Benzodiazepines més 3 mesos en polimedicats fràgils	3,46	1.534	44.332	+
MEDHTA - Control excessiu PAS en població polimedicada i fràgil	4,11	1.828	44.482	+
POLIMED - Polimedicats				#
POLIMED15 - Polimedicats > 15 ATC	0,60	7.672	1.288.487	+

La seguretat del pacient des d'una visió INDIVIDUAL

Revisión de la medicación centrada en la persona

Examen crític i estructurat del règim terapèutic d'un pacient per tal d'optimitzar-ne l'impacte sobre la salut i minimitzar els riscos associats a la polimediació.

Metodologia a seguir en la revisió de la medicació centrada en la persona:




[Posicionamiento SEFAP en la revisión de la medicación centrada en la persona](#)



[Model de prescripció centrada en la persona \(PCP\)](#)

Distribució de la població estratificada segons el risc de complexitat. (Adaptació de la piràmide de Kaiser)



Presenten més risc de:

- Incrementar l'estada hospitalària i els reingressos.
- Empitjorar el grau de discapacitat, estat funcional i qualitat de vida.
- Incrementar de la mortalitat.


Proposta d'un pla farmacològic individualitzat

Com a resultat de tot aquests processos de revisió, molt sovint se'n deriva una desprescripció de determinats fàrmacs.

El metge no només ha de comunicar al pacient els canvis realitzats, sinó que també n'ha de buscar l'acord i promoure'n la implicació en la presa de decisions.

Els canvis de la medicació derivats de la revisió:

- S'han de pactar prèviament amb el pacient.
- S'han d'iniciar progressivament, un per un i respectant els temps del pacient.
- Cal explicar al pacient de manera clara els beneficis que s'esperen dels canvis de la medicació



Conclusions

- L'Atenció Primària presenta una sèrie de característiques que condicionen l'abordatge i la implementació d'estratègies per millorar la seguretat dels pacients.
- Dins de les estratègies amb visió poblacional, la integració en la historia clínica electrònica de sistemes d'avisos i algorismes per l'ajuda de presa de decisions, és una de les eines utilitzades des de fa anys en el nostre àmbit.
- Les estratègies de desprescripció ajuden a la desmedicalització de la població i a minimitzar la possible iatrogènia dels medicaments.
- Cal avançar en la implementació d'estratègies de revisió de la medicació centrada en la persona amb l'objectiu d'augmentar els beneficis en salut i minimitzar els riscos associats a la medicació.
- Els canvis de la medicació derivats de la revisió de la medicació s'han de pactar prèviament amb el pacient i iniciar de manera progressiva.

Gràcies

Amelia Troncoso Mariño
atroncoso@gencat.cat

