

2025 Calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques



	Infecció per virus respiratori sincicial	Diftèria Tètanus Tos ferina	Poliomielitis	Malaltia per <i>Haemophilus influenzae</i> b	Hepatitis B	Infecció per rotavirus	Malaltia per pneumococ	Malaltia per meningococ	Xarampió Rubèola Parotiditis	Varicel·la	Hepatitis A	Infecció per virus del papil·loma humà	Grip	Herpes zòster
0 mesos	Virus respiratori sincicial¹													
2 mesos		Hexavalent				Rotavirus²	Pneumococ conjugada	Meningococ B						
4 mesos		Hexavalent					Pneumococ conjugada	Meningococ C conjugada	Meningococ B					
6 mesos														
11 mesos		Hexavalent					Pneumococ conjugada						Grip cada any (de 6 a 59 mesos)	
12 mesos								Meningococ conjugada tetravalent (ACWY)	Meningococ B	Triple vírica				
15 mesos											Varicel·la	Hepatitis A		
3 anys										Triple vírica	Varicel·la			
4 anys														
6 anys		DTPa-PI									Hepatitis A			
11-12 anys		dTpa						Meningococ conjugada tetravalent (ACWY)³			Varicel·la⁴	Hepatitis A⁴	Virus del papil·loma humà	
Embarassades		dTpa⁵											Grip	
40 anys		Td												
A partir de 60 anys													Grip cada any	
65 anys		Td					Pneumococ conjugada							Herpes zòster⁶
80 anys														Herpes zòster⁶

1. Immunització de tots els infants menors de 12 mesos, en la seva primera temporada epidèmica del VRS, de la següent manera: nascuts i nascudes amb anterioritat a l'inici de la temporada epidèmica del VRS (entre abril i setembre), durant el mes de setembre-octubre, i nascuts i nascudes durant la temporada epidèmica de VRS (d'octubre a març), preferentment abans de l'alta al naixement.

2. Vacunació contra el **rotavirus** a partir dels 2 mesos d'edat i seguint la pauta segons la vacuna disponible.

3. Contra el **meningococ conjugada tetravalent (MACWY)**: s'han de vacunar els adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de la vacuna MACWY a partir dels 10 anys d'edat. També s'ha de fer repesca fins als 18 anys d'edat, inclosos.

4. **Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna contra la varicel·la (V)**: només s'han de vacunar als 11-12 anys els infants no immunitzats (no vacunats o sense antecedents de malaltia) o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis).

5. S'ha d'administrar la **vacuna dTpa a les embarassades**, en cada embaràs, a partir de les 27 setmanes, preferentment entre les setmanes 27 i 32.

6. S'han d'administrar dues dosis de la **vacuna contra l'herpes zòster** a les persones que compleixin 65 anys o 80 anys.

Nota: Es recomana la vacunació contra el SARS-CoV-2 cada any durant la campanya de tardor, segons les recomanacions vigents (persones majors de 60 anys i altres amb condicions de risc).