

Programa d'immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) a Catalunya

Indicacions




Infants nascuts **durant** la temporada de VRS
Protecció en néixer



Hospital

Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar



Infants nascuts **abans** de la temporada de VRS
Campagna d'immunització abans de l'inici de l'epidèmia de VRS

Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar



En **lactants i nadons d'alt risc** menors de 24 mesos d'edat, l'administració es realitzarà al centre d'atenció primària o al centre hospitalari de referència. En prematurs només s'administra en menors de 12 mesos.

Beyfortus® disposa de dues presentacions



Pes

Dosi

Color de la xeringa

< 5 kg

50 mg = 0,5ml

Morat

≥ 5 kg

100 mg = 1 ml

Blau clar

En infants amb condicions d'alt risc, la dosi per a la segona temporada serà de 200 mg (2 x 100 mg), sempre que pesin ≥ 10 kg. En cas que pesin < 10 kg, s'administrarà una única dosi de 100 mg.

Indicacions



S'administra en una única dosi de nirsevimab per via intramuscular (excepte en lactants d'alt risc menors de 24 mesos).



Conserveu entre 2°C i 8°C.
No ho agiteu ni exposeu a fonts de calor directes.
Protegir de la llum.



Tenint en compte les diferents presentacions del fàrmac i les indicacions, és imprescindible identificar correctament els productes a les neveres per evitar errors.



**Generalitat
de Catalunya**

És obligatori el registre de totes les dosis administrades a Catalunya de nirsevimab, i es distribuirà a tots els centres d'atenció primària i hospitals públics i privats amb més de 50 naixements anuals. No es facilitarà als centres que no en garanteixin la correcta conservació i registre.