


# Comparativa dels Tractaments amb Immunoglobulines (Ig)



Les **Immunoglobulines (Ig)** són **proteïnes de defensa** que protegeixen i ajuden a combatre infeccions. Els **tractaments amb Ig** són **medicaments** que provenen de la sang de més de 1.000 donants (hemoderivat) i aporten les Ig **necessàries** quan el cos humà no les fabrica o no funcionen.

## Ig Intravenoses

**Com s'administren?**

- S'administren directament en una vena de la mà o del braç, en 1 únic lloc d'injecció.

**On i qui les administra?**

- S'administren a l'hospital pel personal d'infermeria.

**En quant de temps?**

- L'administració dura de 4 a 6 hores.

**Cada quan es necessiten?**

- Cada 3-4 setmanes.

**Què pot passar?**

- **Reaccions generals** (febre, calfreds, molèsties...)
- Reaccions locals.

**Com evitar-les?**

- Aquestes reaccions es poden prevenir amb medicaments abans d'administrar-les.



## Ig Subcutànies

- S'administren amb una petita agulla a la grassa que hi ha just a sota de la pell de la panxa o de les cuixes.
- En 1-2 llocs a la vegada.

- A casa, les administren els familiars o un mateix després d'aprendre a l'hospital.
- Suport telefònic des de l'hospital

- De 15 a 60 minuts aproximadament.

- Cada 1-2 setmanes.

- Reaccions generals.
- **Reaccions locals** (envermelliment de la pell, picor e inflamació).

- Es poden posar cremes o fred local per ajudar a prevenir-les.
- Es pot canviar de zona de tant en tant.

## Ig Subcutànies amb Hialuronidasa

- Inclou **hialuronidasa** per tal de facilitar la seva administració.

- De 1 a 2 hores aproximadament.

- Cada 3-4 setmanes.

