

---

# **Nota informativa sobre la continuació de pautes de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en noies que han iniciat la vacunació amb una vacuna diferent de la disponible, o si es desconeix el producte utilitzat.**

## **Programa de Vacunes**

Octubre de 2015

El programa de vacunacions de Catalunya recomana realitzar la pauta completa de vacunació amb el mateix producte sempre que sigui possible. No obstant això, si no es coneix o no es disposa del producte amb què es va iniciar la pauta vacunal, es pot completar la vacunació amb la vacuna contra el VPH disponible.

Actualment, a Catalunya s'efectua una vacunació de manera sistemàtica a sisè de primària amb la vacuna tetravalent (VPH4 -Gardasil®-), i amb una pauta de dues dosis (tres dosis en el cas de noies més grans de 13 anys). En cas d'haver de continuar una vacunació iniciada amb la vacuna bivalent (VPH2 -Cervarix®-) amb la tetravalent, **es recomana administrar una pauta amb un total de tres dosis**, tant en les noies de menys de 14 anys com en les més grans d'aquesta edat. Es recomana seguir la **pauta 0, 1-2 i 6**: administrar la segona dosi 1 o 2 mesos després de la primera dosi (interval mínim 4 setmanes) i la tercera dosi amb un interval de 6 mesos respecte de la primera, i de 4 mesos de la segona dosi (interval mínim 12 setmanes). En el cas de les noies **menors de 14 anys** a les quals només s'hagi administrat una dosi de Cervarix®, es poden **administrar dues dosis de Gardasil® amb un interval de 6 mesos entre les dues** (com en el cas de la pauta de dues dosis), i amb un interval mínim de 4 setmanes entre la dosi de vacuna bivalent i la primera tetravalent.

Dosis VPH2 prèvies	Edat	Interval dosis prèvies	Dosis VPH4 a administrar
1	<14 anys	-	2 (amb un interval de 6 m)
1	>13 anys	-	2
2	<15 anys	≥ 6 mesos	Cap dosi
		< 6 mesos	1
2	>14 anys	≥ 1 mes	1

**Pautes per completar les vacunacions iniciades amb VPH2, si cal finalitzar-les amb VPH4.**