

Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Actualitzat: 06.11.2020

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquesta guia està en revisió permanent en funció de l'evolució de la malaltia i de la nova informació de què es disposi.

Coordinació:

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquest document s'ha basat en les actualitzacions del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

Alguns drets reservats

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

Edició:

Barcelona, març de 2020

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL:

<http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.



Contingut

1	Introducció.....	4
2	Definicions.....	5
3	Actuacions.....	7
3.1	Servei telefònic de consulta.....	7
3.2	Estudi i maneig de casos i contactes.....	7
3.3	Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2.....	10
3.4	Realització de proves de diagnòstic microbiològic.....	11
	Annex 1. Models d'informe.....	13
	Annex 2. Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública.....	17
	Annex 3. Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral i Unitats de Salut Laboral.....	19

1 Introducció

Igual que en les fases anteriors, en l'actual fase cal que tots els agents amb responsabilitats sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin per fer front a la pandèmia de COVID-19.

La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.

En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han tingut i tenen un paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei amb l'objectiu general d'evitar contagis i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.

Aquesta actualització de la guia no entrarà en temes que ja estan tractats en altres documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a possibles dubtes.

La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:

- Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. L'article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema Nacional de Salut, estableix que:
 1. D'acord amb el que estableixen l'article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i l'article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de prevenció ha de col·laborar amb els serveis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats responsables de salut pública de l'àrea de salut, que defineix la Llei general de sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que actuïn en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser desplegada per les comunitats autònomes en l'àmbit de llurs competències.
 2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en matèria sanitària.
- Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

L'article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com estableix l'article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.

En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

També cal tenir en compte el document ***Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2*** del Ministerio de Sanidad.

En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s'ha de tenir en compte, en primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries i de salut pública.

En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que canvien ràpidament amb el temps. En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte l'assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori (veure adreces de contacte a l'annex 3).

2 Definicions

L'actual situació comporta canvis en la gestió de casos i contactes. En aquesta fase és important la detecció precoç de qualsevol persona que pugui tenir infecció activa i que pugui transmetre la malaltia així com la identificació i seguiment dels contactes estrets per tal d'evitar un increment en el nombre de casos.

Segons el ***Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2*** de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

- **Cas sospitós d'infecció:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li ha de **fer tan aviat com sigui possible una PCR o un test ràpid antigènic (el test ràpid antigènic està indicat sempre i quan la simptomatologia sigui recent, de 5 dies o menys)**. Si la **prova** és negativa i hi ha alta sospita clínica de COVID-19 s'ha de:

- fer una PCR amb mostra nasofaríngia si s'havia fet un test ràpid antigènic

- repetir la PCR abans de 48h, també amb mostra nasofaríngia, si s'havia fet una PCR

i actuar d'acord amb les indicacions del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**

- **Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva **o test antigènic positiu.**

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per test ràpids) o **immunocromatografia (en aquest cas, però, cal descartar que no es tracti d'un resultat d'IgM falsament positiu).**

- Persona asimptomàtica amb PCR positiva **o test antigènic positiu** amb IgG negativa o no practicada.

- **Cas confirmat amb infecció resolta:** Persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR **o del test antigènic.**

- **Cas probable:** Persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19 i amb resultats de PCR **o test antigènic** negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l'àmbit de centres tancats o en l'àmbit familiar, o els casos sospitosos amb PCR no concloent. Per al maneig de casos probables es seguiran les mateixes indicacions que per als casos confirmats.

- **Cas descartat:** Cas sospitós amb PCR negativa **o test antigènic negatiu** i IgM també negativa, si aquesta prova s'ha realitzat, en el qual no hi ha una alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

- **Contacte estret.** Es considerarà com a contacte estret:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci...) durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal de concloure que s'ha mantingut una protecció adequada, s'ha de valorar de forma rigorosa l'existència de **mesures de protecció durant tot el temps de contacte. En el cas dels contactes estrets laborals serà el SPRL qui valorarà l'existència i l'adequació de les mesures de protecció.**

- **En el moment actual i per acord consensuat en el marc de la ponència d'alertes estatal, no es recomana fer estudi de contactes en viatgers i, per tant, no es consideren contactes**

estrets els contactes en avions, trens o altres mitjans de transport terrestre de llarg recorregut.

3 Actuacions

3.1 Servei telefònic de consulta

Els serveis de prevenció, tant propis com aliens, poden contribuir a informar sobre les mesures a prendre per afrontar la pandèmia de COVID-19, actuant de forma complementària als serveis d'informació telefònica (061) i a la informació accessible a les pàgines web, i a la resta del sistema sanitari. Es proposa que els SPRL estableixin un servei telefònic de consulta per als seus propis treballadors i pels treballadors de les empreses clients pel que fa a la pandèmia de COVID-19. No es tracta, per tant, de substituir al 061 rebent trucades de qualsevol persona i sobre qualsevol tema, sinó de donar un suport dirigit als treballadors propis i d'empreses clients pel que fa a l'actuació enfront del nou coronavirus.

Els serveis de prevenció que optin per aquest servei han de:

- Establir un telèfon o telèfons de contacte per a fer les consultes, establir l'horari de prestació del servei i dies de servei.
- Organitzar el servei amb els seus professionals.
- Donar a conèixer el servei als treballadors de les empreses clients pels mitjans que es considerin més idonis.
- Seguir les recomanacions i instruccions dels procediments i guies establertes per l'autoritat sanitària, en especial la versió sempre més actual disponible del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**.
- En el cas de treballadors/es que presentin un quadre clínic o simptomatologia compatible amb la definició de cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, s'indicarà que se li ha de realitzar una PCR o test antigènic, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, tan aviat com sigui possible, ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat) o a través del seu centre d'atenció primària amb el qual s'haurà de posar en contacte (i si no pot amb el 061). Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels resultats de la PCR.

3.2 Estudi i maneig de casos i contactes

En aquesta fase és molt important la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i detectar els seus contactes estrets per poder controlar la transmissió de la malaltia i evitar rebrotos.

Els SPRL han de col·laborar amb les autoritats sanitàries en aquesta detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes i en la seva notificació.

3.2.1 Estudi i maneig de casos

Els SPRL han de col·laborar en la detecció d'aquests casos, donant suport a la tasca que es fa des dels serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

El SPRL, quan detecti un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 li indicarà que ha de fer aïllament domiciliari i se li ha de realitzar una PCR **o test antigènic tan aviat com sigui possible**. El SPRL pot fer-ho, sempre que disposi de mitjans per obtenir les mostres i enviar-les a un laboratori autoritzat (en el cas de la PCR). En cas que no sigui possible, la confirmació s'haurà de fer des de l'atenció primària, amb la qual haurà de contactar la persona afectada.

Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR **o test antigènic** i s'iniciarà, **per part del SPRL**, la identificació dels seus contactes estrets laborals.

Dels casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL) s'haurà de recollir i notificar diàriament la informació que consta a l'annex 2 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**.

Segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), els SPRL hauran d'enviar la informació per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia al SCASL a l'adreça salut_laboral_aspcat@gencat.cat. A l'annex 2 hi ha la llista d'adreces dels SVE.

Pel maneig dels casos es seguirà el que estableix el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** en el seu punt 5.

En general, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a l'activitat laboral una vegada finalitzat el període d'aïllament, tret d'indicacions específiques de les autoritats sanitàries o en el cas dels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris, així com aquells que atenguin o tinguin contacte amb col·lectius d'especial vulnerabilitat (serveis d'atenció domiciliària per exemple) d'acord amb el que estableix el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i **l'Annex al "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-cov-2" (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20)**.**

A l'annex 1.1 hi ha un model d'informe, dirigit al metge d'atenció primària i que s'ha de lliurar a la persona afectada, perquè el SPRL acrediti la necessitat d'aïllament preventiu del cas i facilitar així la tramitació de la Incapacitat temporal per part del servei públic de salut.

D'acord amb el RDL 28/2020 (disposició addicional quarta) es consideren com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del

virus SARS-CoV-2, quan així s'acrediti pel SPRL. Aquesta consideració serà efectiva fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A l'annex 1.4 hi ha un model d'informe per a l'acreditació per part del SPRL.

3.2.2 Estudi i maneig de contactes

Els SPRL seran els encarregats d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment de contactes estrets laborals d'aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**.

L'estudi de contactes estrets s'iniciarà en el moment que es detecti un cas sospitós. Si el resultat de la PCR o test antigènic del cas sospitós és negatiu, i no hi ha alta sospita clínica, s'aturarà la identificació i control de contactes. El període a considerar per a la detecció de contactes és des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas i fins el moment en que aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de realització de la prova.

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 3 mesos anteriors, estaran exemptes de fer quarantena, al no haver-hi descrits en el moment actual casos de re-infecció abans d'aquest període.

No obstant això, cal tenir en compte que si una persona que s'ha recuperat de la COVID-19 té nous símptomes molt suggestius de COVID-19, podria ser necessari avaluar-la i, si cal, realitzar un test antigènic o una nova PCR, especialment si la persona ha tingut contacte amb algú infectat per COVID-19.

A tots els contactes estrets de casos confirmats se'ls ha de recollir les dades epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari inclòs a l'annex 4 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de l'ASPCAT. Els annexos s'han d'enviar, per correu electrònic al SVE corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia al SCASL a l'adreça salut_laboral_aspcat@gencat.cat. Les dades Codi de cas i Codi de contacte NO les ha d'omplir el SPRL.

De forma general, qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas confirmat n'ha de ser informada del fet, se li ha de comunicar que ha de romandre en quarantena al domicili durant un període de 10 dies des de l'últim contacte amb el cas. A més se li faran les recomanacions que consten, per a les persones que són contacte estret d'un cas confirmat, en el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**.

Als contactes estrets se'ls hi ha de fer un test de diagnòstic d'infecció activa en el moment de la confirmació del cas o tant aviat com sigui possible, amb l'objectiu principal de detectar

precoçment nous casos positius. D'acord amb [l'Annex al "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-cov-2" \(18.10.20\) en fase de mitigació \(30.10.20\)](#) aquest testeig es realitzarà mitjançant tests antigènics.

Els SPRL ho poden fer sempre que disposin de mitjans adequats. Si el resultat del test és negatiu es continuarà la quarantena fins el dia 10 des de l'últim contacte amb el cas i si el contacte continua asimptomàtic després de la quarantena podrà reincorporar-se a la seva feina sense necessitat de més proves.

No obstant això, es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una prudència especial entre els dies 10 i 14, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible i si apareix simptomatologia en aquests dies, auto-confinament immediat i consulta per a valoració clínica i de realització de prova diagnòstica.

Els contactes de contactes estrets no han de fer quarantena

En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables amb infecció activa en els quals s'ha establert un vincle epidemiològic, excepte en els àmbits residencials on un sol cas positiu es considera un brot), **El SPRL haurà d'investigar i analitzar les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades o incompliment d'aquestes...)** per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar nous brots.

Sempre que procedeixi un període de quarantena el SPRL, en la seva funció de col·laboració per fer front al nou coronavirus i en la gestió de la incapacitat temporal (IT), lliurarà a la persona afectada un document (annex 1.1) que confirmi la procedència d'aquest aïllament, per tal que el Sistema Públic de Salut pugui donar la baixa. Per a això, la persona afectada s'haurà de posar en contacte, preferentment per telèfon o per mitjans telemàtics, amb el seu CAP.

3.3 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

El SPRL ha de determinar la presència de personal amb condicions d'especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (aquells treballadors que per les seves característiques o estat de salut, d'acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s'exposen al SARS-CoV-2 o presentar una evolució clínica més desfavorable en cas de patir la COVID-19) i avaluar el nivell de risc al que poden estar exposats per tal de considerar-los treballadors especialment sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document de consens de l'Associació Catalana de Salut Laboral *de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles*

enfrent el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia¹, es diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors especialment sensibles (TES): ser considerada PEV amb relació a la COVID-19 no suposa ser considerat TES d'acord amb l'article 25 de la LPRL. Hi ha un element clau que és el "risc laboral" al que s'ha d'exposar i que hauria d'estar específicament avaluat i del qual l'empresa l'ha de protegir.

El Ministerio de Sanidad, d'acord amb l'evidència científica a **28 d'agost** de 2020 i el principi de precaució, ha definit com grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. Aquests grups poden variar en funció de les noves evidències.

La decisió final sobre què fer amb els treballadors que puguin estar inclosos en aquests grups vulnerables ha de ser fruit d'una avaluació individual que tingui en compte l'estat de salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

En el document ***Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2, en els seus annexos 4 i 5*** hi ha les guies per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat a l'àmbit sanitari i sociosanitari i als àmbits no sanitaris.

Si després de la valoració individualitzada, el SPRL considera que la persona treballadora és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe (annex 1.2). Aquest informe, que és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut emetin el comunicat de baixa, s'enviarà preferentment a l'ICAM, a la bústia de correu electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: **bustia.sgam@gencat.cat**

Tarragona: **icam.tarragona.salut@gencat.cat**

Lleida: **bustiaicam.lleida@gencat.cat**

Girona: **icam.girona.salut@gencat.cat**

¹ Arch PrevRiesgos Labor. 2020;23(2):253-271

El SPRL informará de les actuacions anteriors a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut en el treball, si n'hi haguessin, guardant la deguda confidencialitat.

3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic

L'aplicació i la realització de proves diagnòstiques s'ha de fer d'acord amb les indicacions que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, per tant, els SPRL han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació que s'hi descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d'infecció, a les estratègies de retorn al treball **o a la realització de cribratges**).

En el moment actual no es recomana la realització de PCR o tests antigènics a persones asimptomàtiques fora de determinades estratègies plantejades, com la detecció precoç de casos entre els contactes estrets, en el context de brots o de forma prèvia a algunes actuacions assistencials.

Les propostes de realització de cribratges només haurien de sortir dels serveis de vigilància epidemiològica territorials i aplicar-se a nivell poblacional en zones de baixa incidència i/o en estudi de brots complexos en determinats lloc d'elevada exposició d'acord amb el que estableix **[l'Annex al "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-cov-2" \(18.10.20\) en fase de mitigació \(30.10.20\)](#)**.

No es recomana repetir la PCR a les persones asimptomàtiques que ja van tenir una prova positiva que es va negativitzar, atesa la manca d'evidència en el moment actual de la transmissibilitat a partir de pacients **asimptomàtics** que tornen a presentar PCR positiva. **En casos excepcionals, si una persona té un resultat positiu de fa almenys 3 mesos i torna a presentar símptomes, es podria realitzar un test antigènic o una nova PCR si la clínica és molt suggestiva d'infecció per SARS-CoV-2.**

Segons l'evidència actual l'OMS i les autoritats sanitàries, només recomanen l'ús de tests **serològics** ràpids **per a determinats estudis i amb finalitats d'investigació**. Aquests no han **d'utilitzar-se** per al diagnòstic ni per a la presa de decisions clíniques, **fins que estigui disponible l'evidència que recolzi el seu ús per a aquestes indicacions**.

En cas que una empresa, mitjançant el seu SPRL i laboratoris autoritzats, decideixi fer tests ràpids o altres proves microbiològiques fora de les indicacions de les autoritats sanitàries, ha de poder fer les proves de diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per acabar el procés d'interpretació de resultats i diagnòstic i la presa de decisions que se'n derivi i ha de comunicar els resultats per les vies abans referides.

ANNEX 1. MODELS D'INFORMES

1. INFORME DE CONFIRMACIÓ D'AILLAMENT DOMICILIARI/QUARANTENA EN CAS SOSPITÓS, CONFIRMAT O CONTACTE ESTRET

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., amb DNI professió/ocupació..... a l'empresa compleix criteris per a ser considerat/da:

- cas sospitós
- cas confirmat
- contacte estret d'un cas confirmat de coronavirus,

Per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar aïllament domiciliari durant 10 dies / quarantena domiciliària durant **10** dies, comptats des del dia.....,

data en la qual es va produir la manifestació clínica o el contacte. Aquesta persona ha estat informada de les mesures a adoptar d'acord amb el que estableix el *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2* del Departament de Salut.

Lloc i data

Signatura

2. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D'IT

INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

La persona pateix¹....., que actualment es troba², presentant comorbiditats Sí NO

Sobre la base dels annexos 4 o 5 del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc³.....Com que no hi ha possibilitat d'adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a l'empresa es considera que hauria de passar a situació d'incapacitat temporal.

Lloc i data,

Signatura

1 Per confidencialitat, especificar grup de malaltia (no patologia concreta) o condició

2 Compensada/ descompensada

3 Baix (1), mitjà (2), alt (3), molt alt (4)

3. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. FI DE LA NECESSITAT D'IT

INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., d'acord amb els criteris del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad (de data.....), no és necessari que continuï en situació d'incapacitat temporal per:

- no pertànyer als grups vulnerables establerts actualment en el citat *Procedimiento*

- millora de les condicions de treball i/o adaptació del lloc/reubicació en un altre lloc de treball i/o millora de les mesures preventives

Lloc i data,

Signatura

4. INFORME PER A VALORACIÓ DE LA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL

INFORMACIÓ DIRIGIDA A LA MUTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., amb DNI professió/ocupació..... a l'empresa compleix criteris per a ser considerat/da:

- cas sospitós de COVID-19
- cas confirmat de COVID-19

I com que es tracta de personal que treballa en un centre

- sanitari
- sociosanitari

que ha estat exposat a aquest risc específic en el desenvolupament de la seva feina, aquesta malaltia compleix també els criteris per ser considerada com a contingència professional derivada d'accident de treball, tal com estableix el RDL 28/2020.

Lloc i data

Signatura

ANNEX 2.

SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)

Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674
epidemiologia@gencat.cat

Agència de Salut Pública de Barcelona

(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme

C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
08005 Barcelona
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d'Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental

Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 936 246 432
A/e epi.valles@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.
08241 Manresa
Telèfon 938 753 381 (centraleta)
A/e uvercc@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona

Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Telèfon 872 975 666 (centraleta)

A/e epidemiologia.girona@gencat.cat **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran**

C. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Telèfon 973 701 600 (centraleta)
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta)
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat

Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Plaça Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Telèfon 977 495512
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat

Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)

Telèfon: 627 480 828. (Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius).

ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE SALUT LABORAL

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)

A/e: salut_laboral_aspcat@gencat.cat

USL Barcelona

Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)

Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58

A/e: usl@aspb.cat / usl.barcelona@gencat.cat

USL Barcelonès Nord - Maresme

C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)

Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14

A/e: usl.bnordimaresme@gencat.cat

USL Costa de Ponent

C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)

Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00

A/e: usl.costaponent@gencat.cat

USL Vallès

Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)

Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20

A/e: usl.valles@gencat.cat

USL Catalunya Central

C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08

A/e: usl.catalunyacentral@gencat.cat

USL Girona

C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00

A/e: usl.girona@gencat.cat

USL Lleida i Alt Pirineu i Aran

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176

A/e: usl.lleida@gencat.cat

USL del Camp de Tarragona

CAP Llibertat

C. General Moragues, 52, 2a planta (43201 Reus)
Telèfon: 977 32 01 07 / Fax: 977 31 73 80

A/e: usl.reus@gencat.cat i usl.tarragona@gencat.cat

USL Terres de l'Ebre

Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)
Telèfon: 667 118 137

A/e: usl.ebre@gencat.cat