

# Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Actualitzat: **14.01.2022**

**Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral**

Aquesta guia està en revisió permanent en funció de l'evolució de la malaltia i de la nova informació de què es disposi.

**Coordinació:**

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquest document està basat prioritàriament en les actualitzacions del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

**Alguns drets reservats**

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

**Edició:**

Barcelona, març de 2020

**Assessorament lingüístic:**

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

**URL:**

<http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

**Disseny de plantilla accessible 1.03:**

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.



## Contingut

1	Introducció.....	4
2	Definicions.....	5
3	Actuacions.....	7
3.1	Servei telefònic de consulta.....	7
3.2	Estudi i maneig de casos i contactes.....	8
3.3	Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2.....	10
3.4	Realització de proves de diagnòstic microbiològic.....	12
	Annex 1. Models d'informe.....	14
	Annex 2. Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública.....	18
	Annex 3. Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral i Unitats de Salut Laboral.....	20

## 1 Introducció

Igual que des del seu inici, en l'actual fase de la pandèmia de COVID-19 cal que tots els agents amb responsabilitats sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin per fer-hi front.

La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.

En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han tingut i tenen un paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei amb l'objectiu general d'evitar contagis i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.

Aquesta actualització de la guia no entrarà en temes que ja estan tractats en altres documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a possibles dubtes.

La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:

- Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. L'article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema Nacional de Salut, estableix que:
  1. D'acord amb el que estableixen l'article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i l'article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de prevenció ha de col·laborar amb els serveis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats responsables de salut pública de l'àrea de salut, que defineix la Llei general de sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que actuïn en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser desplegada per les comunitats autònomes en l'àmbit de llurs competències.
  2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en matèria sanitària.
- Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

L'article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com estableix l'article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.

En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s'ha de tenir en compte, en primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries i de salut pública.

En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que canvien ràpidament amb el temps. **Per tant, quan en aquesta guia es fa referència a altres documents, s'ha de comprovar que la versió a la que s'accedeixi és la versió més actualitzada.**

En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte l'assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori (veure adreces de contacte a l'annex 3).

## 2 Definicions

Segons el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

- **Cas sospitós d'infecció:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes com **rinorrea, congestió nasal, esternuts, odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees**, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

Si el cas va presentar una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) fa més de 90 dies, es considerarà un cas sospitós de reinfecció

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li ha de fer tan aviat com sigui possible una PDIA: un test antigènic ràpid (TAR) sempre que la simptomatologia sigui recent, de 5 dies o menys, o una PCR si han passat més de 5 dies des de l'inici de la clínica. Si la prova és negativa i hi ha alta sospita clínica de COVID-19 s'ha de:

- fer una PCR amb mostra nasofaríngia si s'havia fet un TAR.

- repetir la PCR, preferiblement abans de 48h, també amb mostra nasofaríngia, si s'havia fet una PCR

i actuar d'acord amb les indicacions del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**

- **Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una altra tècnica molecular equivalent (Amplificació mitjançant transcripció) positiva.

- Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que la persona no hagi passat la infecció durant els 90 dies previs.

- **Cas amb infecció resolta:**

- Persona asimptomàtica no vacunada en què s'ha descartat infecció activa i amb resultat positiu d'IgG per serologia d'alt rendiment capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat en una persona asimptomàtica no vacunada.

- **Cas probable:**

- Persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19 i amb resultats de PCR o TAR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no conclouent.

- Cas amb alta sospita clinicoepidemiològica amb prova diagnòstica repetidament negativa (almenys una PCR) i serologia positiva pel SARS-CoV-2 realitzada per tècniques serològiques d'alt rendiment.

- **Cas descartat:** Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha una alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.

- **Contacte estret.** Es considerarà com a contacte estret:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres (ex. convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci...), sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 24h.

Per tal de concloure que s'ha mantingut una protecció adequada, s'ha de valorar de forma rigorosa l'existència de mesures de protecció durant tot el temps de **contacte i l'ús adequat de les mesures de protecció respiratòria**. Cal valorar també si ha estat en un espai tancat i poc ventilat. En el cas dels contactes estrets laborals el SPRL ha de valorar l'existència i l'adequació de les mesures de protecció. **Els SVE poden ampliar la definició de contacte estret atenent a les condicions del contacte.**

Actualment, no es recomana excloure com a contacte estret les persones que utilitzen mascaretes no homologades.

- En el moment actual i per acord consensuat en el marc de la ponència d'alertes estatal, no es recomana fer estudi de contactes en viatgers i, per tant, no es consideren contactes estrets els contactes en avions, trens o altres mitjans de transport terrestre de llarg recorregut, excepte en les situacions en què els SVE sospitin una nova variant vírica i que calgui el rastreig exhaustiu de contactes, o en el context d'un brot epidèmic.

Degut a l'expansió de la variant Òmicron a Catalunya en el moment actual, les persones correctament vacunades o que hagin passat la malaltia fa més de 90 dies també seran considerades contactes estrets.

Els contactes que no compleixin els criteris de contacte estret es consideraran contactes no estrets (CNE). En aquests CNE no caldrà, **en general**, la realització d'actuacions addicionals com són la realització de proves, de quarantena o de baixa laboral, **excepte en el cas que els SVE ho recomanin dins de l'estudi d'un brot.**

## 3 Actuacions

### 3.1 Servei telefònic de consulta

Els serveis de prevenció, tant propis com aliens, poden contribuir a informar sobre les mesures a prendre per afrontar la pandèmia de COVID-19, actuant de forma complementària als serveis d'informació telefònica (061) i a la informació accessible a les pàgines web, i a la resta del sistema sanitari. Es proposa que els SPRL estableixin un servei telefònic de consulta per als seus propis treballadors i pels treballadors de les empreses clients pel que fa a la pandèmia de COVID-19. No es tracta, per tant, de substituir al 061 rebent trucades de qualsevol persona i sobre qualsevol tema, sinó de donar un suport dirigit als treballadors propis i d'empreses clients pel que fa a l'actuació enfront del nou coronavirus.

Els serveis de prevenció que optin per aquest servei han de:

- Establir un telèfon o telèfons de contacte per a fer les consultes, establir l'horari de prestació del servei i dies de servei.
- Organitzar el servei amb els seus professionals.
- Donar a conèixer el servei als treballadors de les empreses clients pels mitjans que es considerin més idonis.
- Seguir les recomanacions i instruccions dels procediments i guies establertes per l'autoritat sanitària, en especial la versió sempre més actual disponible del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.**
- En el cas de treballadors/es que presentin un quadre clínic o simptomatologia compatible amb la definició de cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, s'indicarà que se li ha de

realitzar una PCR o TAR, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, tan aviat com sigui possible, ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat) o a través del seu centre d'atenció primària amb el qual s'haurà de posar en contacte (i si no pot amb el 061). Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels resultat de la PDIA.

## 3.2 Estudi i maneig de casos i contactes

**En fase de mitigació és essencial poder mantenir el diagnòstic precoç, testatge i aïllament dels casos. El traçat i testatge de contactes s'ha d'adaptar a les capacitats del sistema.**

### 3.2.1 Estudi i maneig de casos

Els SPRL han de col·laborar en la detecció d'aquests casos, donant suport a la tasca que es fa des dels serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

El SPRL, quan detecti un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 li indicarà que ha de fer aïllament domiciliari i se li ha de realitzar una PCR o TAR tan aviat com sigui possible. El SPRL pot fer-ho, sempre que disposi de mitjans per obtenir les mostres i, en el cas de les PCR, enviar-les a un laboratori autoritzat. En cas que no sigui possible, la confirmació s'haurà de fer des de l'atenció primària, amb la qual haurà de contactar la persona afectada.

Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR o TAR i s'iniciarà, per part del SPRL, la identificació dels seus contactes estrets laborals.

Dels casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL) s'haurà de recollir i notificar diàriament la informació que consta a l'annex 2 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**.

Segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), els SPRL hauran d'enviar la informació per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia a la USL de referència del territori corresponent (al del municipi de l'empresa). A l'annex 2 d'aquesta Guia hi ha la llista d'adreces dels SVE i a l'annex 3 les adreces de les USL.

Pel maneig dels casos es seguirà el que estableixen el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**, el **Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública a la fase actual de transmissió comunitària del SARS-CoV2** i l'**Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l'àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat**.

A l'annex 1.1 hi ha un model d'informe, dirigit al metge d'atenció primària i que **es pot lliurar a la persona afectada, en cas que sigui necessari acreditar la necessitat d'aïllament preventiu del cas** i facilitar així la tramitació de la incapacitat temporal per part del servei públic de salut.



D'acord amb el RDL 28/2020 (disposició addicional quarta) es consideren com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV-2, quan així s'acrediti pel SPRL. Aquesta consideració serà efectiva fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El RDL 3/2021, per altra banda, estableix, en el seu article 6, que:

1. el personal que presti serveis en centres sanitaris i sociosanitaris inscrits en els registres corresponents que, en l'exercici de la seva professió, durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris, hagi contret el virus SARS-CoV-2, dins del període comprès des de la declaració de la pandèmia internacional per la Organització Mundial de la Salut fins l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel mencionat virus SARS-CoV-2, tindrà les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional.

2. Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d'emetre el corresponent informe en el qual es faci constar que, en l'exercici de la seva professió ha estat exposat al virus SARS-CoV-2 per la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

A l'annex 1.4 hi ha un model d'informe per a l'acreditació per part del SPRL.

### 3.2.2 Estudi i maneig de contactes

Els SPRL seran els encarregats d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment de contactes estrets laborals d'aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i el Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública a la fase actual de transmissió comunitària del SARS-CoV2**.

**En l'actual situació de transmissió comunitària s'ha de garantir especialment la protecció de les persones i entorns més vulnerables. Per això cal que, a nivell laboral, els SPRL segueixin col·laborant en la detecció i seguiment dels contactes estrets en entorns vulnerables (com centres residencials, centres penitenciaris, centres sanitaris o centres per a persones amb discapacitat), així com, en la resta d'entorns, dels contactes estrets que siguin persones especialment vulnerables com persones treballadores no vacunades, amb immunosupressió o embarassades. Aquestes indicacions poden canviar depenent de l'evolució de la pandèmia.**

El període a considerar per a la detecció de contactes és des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas positiu i fins el moment en que aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de realització de la prova.

A tots els contactes estrets de casos confirmats se'ls ha de recollir les dades epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari inclòs a l'annex 4 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2** de l'ASPCAT. Els annexos s'han d'enviar, per correu electrònic al SVE corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia a la USL de referència del territori corresponent (al del municipi de l'empresa). Les dades Codi de cas i Codi de contacte NO les ha d'omplir el SPRL.

De forma general, qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas confirmat n'ha de ser informada del fet i seguir el que estableixen el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2**, el **Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública a la fase actual de transmissió comunitària del SARS-CoV2** i l'**Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l'àmbit de residències de gent gran, de persones amb discapacitat, centres de dia de gent gran i centres i serveis diürns de persones amb discapacitat**, sempre en la seva versió més actualitzada, ja que les indicacions poden canviar depenent de l'evolució de la pandèmia.

Els contactes estrets que presentin símptomes compatibles amb infecció per SARS-CoV-2 seran considerats com a cas sospitosos i s'haurà d'actuar en conseqüència.

En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables amb infecció activa en els quals s'ha establert un vincle epidemiològic, excepte en els àmbits residencials on un sol cas positiu es considera un brot), el SPRL haurà d'investigar i analitzar les possibles causes (mesures organitzatives inadequades, mesures preventives inadequades o incompliment d'aquestes....) per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar nous brots.

**A l'annex 1.1 hi ha un model d'informe, dirigit al metge d'atenció primària i que es pot lliurar a la persona afectada, en cas que sigui necessari acreditar la necessitat de quarantena i facilitar així la tramitació de la incapacitat temporal per part del servei públic de salut.**

### **3.3 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2**

El SPRL ha de determinar la presència de personal amb condicions d'especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (aquells treballadors que per les seves característiques o estat de salut, d'acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s'exposen al SARS-CoV-2 o presentar una evolució clínica més desfavorable en cas de patir la COVID-19) i avaluar el nivell de risc al que poden estar exposats per tal de considerar-los treballadors especialment sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document de consens de l'Associació Catalana de Salut Laboral *de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles*

enfrent el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia<sup>1</sup>, es diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors especialment sensibles (TES).

El Ministerio de Sanidad, d'acord amb l'evidència científica al maig de 2021 i el principi de precaució, ha definit com grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. Aquests grups poden variar en funció de les noves evidències.

La qualificació d'una persona treballadora com a especialment sensible al SARS-CoV-2 ha de ser fruit d'una avaluació individual en la que s'ha de tenir en compte, a més dels factors de vulnerabilitat, les tasques a realitzar i l'existència o no d'unes condicions de treball que permetin realitzar la feina sense augmentar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora. Aquesta avaluació permetrà determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document [Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2, en els seus annexos III i IV](#) hi ha les guies per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat i el risc a l'àmbit sanitari i sociosanitari i als àmbits no sanitaris. En les guies es té en compte si la persona té una pauta de vacunació completa o no.

Si després de la valoració individualitzada, el SPRL considera que la persona treballadora és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe (annex 1.2 ). Aquest informe, que és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut emetin el comunicat de baixa, s'enviarà preferentment a l'ICAM, a la bústia de correu electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: [bustia.sgam@gencat.cat](mailto:bustia.sgam@gencat.cat)

Tarragona: [icam.tarragona.salut@gencat.cat](mailto:icam.tarragona.salut@gencat.cat)

Lleida: [bustiaicam.lleida@gencat.cat](mailto:bustiaicam.lleida@gencat.cat)

Girona: [icam.girona.salut@gencat.cat](mailto:icam.girona.salut@gencat.cat)

---

<sup>1</sup> Arch PrevRiesgos Labor. 2020;23(2):253-271

El SPRL informará de les actuacions anteriors a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut en el treball, si n'hi haguessin, guardant la deguda confidencialitat.

### 3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic

L'aplicació i la realització de proves diagnòstiques s'ha de fer d'acord amb les indicacions que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, per tant, els SPRL han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació que s'hi descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d'infecció, a les estratègies de retorn al treball o a la realització de cribratges).

En el moment actual no es recomana la realització de PCR o tests antigènics a persones asimptomàtiques fora de determinades estratègies plantejades, com la detecció precoç de casos entre els contactes estrets quan així ho recomanin les autoritats sanitàries, en el context de brots o de forma prèvia a algunes actuacions assistencials.

Qualsevol estudi de cribratge s'ha de fer sempre sota les indicacions i recomanacions de les autoritats de salut pública. Per a la realització de cribratges amb tests antigènics en l'àmbit laboral es tindrà en compte el que estableix el ***Document marc on s'estableixen els criteris per a la realització de tests d'antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l'àmbit laboral.***

De manera general no es recomana repetir la PCR a les persones asimptomàtiques que ja van tenir una prova positiva que es va negativitzar, tot i que els SVE poden decidir una actuació diferent davant el context pandèmic canviant. Si una persona asimptomàtica que ja va tenir un resultat positiu desenvolupa una clínica molt suggestiva d'infecció per SARS-CoV-2, es pot realitzar una nova PCR.

Segons l'evidència actual l'OMS i les autoritats sanitàries, només recomanen l'ús de tests serològics ràpids per a determinats estudis i amb finalitats d'investigació. Aquests no han d'utilitzar-se per al diagnòstic ni per a la presa de decisions clíniques, fins que estigui disponible l'evidència que recolzi el seu ús per a aquestes indicacions.

En cas que una empresa, mitjançant el seu SPRL i laboratoris autoritzats, decideixi fer tests ràpids o altres proves microbiològiques fora de les indicacions de les autoritats sanitàries, ha de poder fer les proves de diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per acabar el procés d'interpretació de resultats i diagnòstic i la presa de decisions que se'n derivi i ha de comunicar els resultats per les vies abans referides.

## ANNEX 1. MODELS D'INFORMES

### 1.1. INFORME DE CONFIRMACIÓ D'AILLAMENT DOMICILIARI/QUARANTENA EN CAS SOSPITÓS, CONFIRMAT O CONTACTE ESTRET

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra. ...., amb DNI ..... professió/ocupació..... a l'empresa ..... compleix criteris per a ser considerat/da:

- cas sospitós
- cas confirmat
- contacte estret d'un cas confirmat de coronavirus,

Per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar aïllament domiciliari durant **7** dies / quarantena domiciliària durant **7** dies, comptats des del dia.....,

data en la qual es va produir la manifestació clínica o el contacte. Aquesta persona ha estat informada de les mesures a adoptar d'acord amb el que estableix el *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2* del Departament de Salut.

Lloc i data

Signatura

## 1.2. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D'IT

### INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra. ...., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

La persona pateix<sup>1</sup>....., que actualment es troba<sup>2</sup> ....., presentant comorbiditats Sí  NO

Sobre la base dels annexos III o IV del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc<sup>3</sup>.....Com que no hi ha possibilitat d'adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a l'empresa es considera que hauria de passar a situació d'incapacitat temporal.

Lloc i data,

Signatura

<sup>1</sup> Per confidencialitat, especificar grup de malaltia (no patologia concreta) o condició

<sup>2</sup> Compensada/ descompensada

<sup>3</sup> Baix (1), mitjà (2), alt (3), molt alt (4)

## 1.3. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. FI DE LA NECESSITAT D'IT INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE/SSA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra. ...., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., d'acord amb els criteris del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad (de data.....), no és necessari que continuï en situació d'incapacitat temporal per:

- no pertànyer als grups vulnerables establerts actualment en el citat *Procedimiento*
  
- millora de les condicions de treball i/o adaptació del lloc/reubicació en un altre lloc de treball i/o millora de les mesures preventives

Lloc i data,

Signatura

## 1.4. INFORME PER A VALORACIÓ DE LA CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL

INFORMACIÓ DIRIGIDA A LA MUTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra. ...., amb DNI ..... professió/ocupació..... a l'empresa ..... compleix criteris per a ser considerat/da:

cas confirmat de COVID-19

I com que es tracta de personal que treballa en un centre

sanitari

sociosanitari

que ha estat exposat a aquest risc específic en el desenvolupament de la seva feina, aquesta malaltia compleix també els criteris per ser considerada com a contingència professional derivada d'accident de treball, tal com estableix el RDL 28/2020, amb les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social otorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional, tal com estableix el RDL 3/2021.

Lloc i data

Signatura



## **ANNEX 2.**

### **SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)**

#### **Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública**

**Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)**

Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674  
epidemiologia@gencat.cat

#### **Agència de Salut Pública de Barcelona**

(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia  
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona  
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme**

C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)  
08005 Barcelona  
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud**

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d'Infermeria, 3a pl.  
(Hospital Universitari de Bellvitge)  
08907 L'Hospitalet de Llobregat  
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental**

Ctra. Vallvidrera, 38  
08173 Sant Cugat del Vallès  
Telèfon 936 246 432  
A/e epi.valles@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central**

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.  
08241 Manresa  
Telèfon 938 753 381 (centraleta)  
A/e uvercc@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona**

Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)  
17002 Girona  
Telèfon 872 975 666 (centraleta)

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran**

C. Alcalde Rovira Roure, 2  
25006 Lleida  
Telèfon 973 701 600 (centraleta)  
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre**

Av. Maria Cristina, 54  
43002 Tarragona  
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta)  
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat

## **Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre**

Plaça Gerard Vergés, 1  
43500 Tortosa  
Telèfon 977 495512  
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat

## **Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)**

Telèfon: 627 480 828. ( Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius).

## **ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE SALUT LABORAL**

### **Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral**

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)

A/e: [salut\\_laboral\\_aspcat@gencat.cat](mailto:salut_laboral_aspcat@gencat.cat)

### **USL Barcelona**

Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)  
Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58

A/e: [usl@aspb.cat](mailto:usl@aspb.cat) / [usl.barcelona@gencat.cat](mailto:usl.barcelona@gencat.cat)

**Per a la comunicació de casos i contactes el correu és:**

**[covidlaboral@aspb.cat](mailto:covidlaboral@aspb.cat)**

### **USL Barcelonès Nord - Maresme**

C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)  
Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14

A/e: [usl.bnordimaresme@gencat.cat](mailto:usl.bnordimaresme@gencat.cat)

### **USL Costa de Ponent**

C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)  
Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00

A/e: [usl.costaponent@gencat.cat](mailto:usl.costaponent@gencat.cat)

### **USL Vallès**

Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)  
Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20

A/e: [usl.valles@gencat.cat](mailto:usl.valles@gencat.cat)

## **USL Catalunya Central**

C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)  
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08

A/e: [usl.catalunyacentral@gencat.cat](mailto:usl.catalunyacentral@gencat.cat)

## **USL Girona**

C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)  
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00

A/e: [usl.girona@gencat.cat](mailto:usl.girona@gencat.cat)

## **USL Lleida i Alt Pirineu i Aran**

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)  
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176

A/e: [usl.lleida@gencat.cat](mailto:usl.lleida@gencat.cat)

## **USL del Camp de Tarragona**

Av. Maria Cristina, 54 (43002 Tarragona)  
Telèfon: 977 22 41 51 ext. 662

A/e: [usl.tarragona@gencat.cat](mailto:usl.tarragona@gencat.cat)

## **USL Terres de l'Ebre**

Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)  
Telèfon: 667 118 137

A/e: [usl.ebre@gencat.cat](mailto:usl.ebre@gencat.cat)